

IMPFKALENDER 2024 - Welche Impfungen sind empfohlen?

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO), Stand März 2024	Säuglinge und Kleinkinder										Kinder und Jugendliche						Erwachsene/ 60Plus			
	6 Wochen	2 Monate	3 Monate	4 Monate	5-10 Monate	11* Monate	12 Monate	13-14 Monate	15 Monate	16-23 Monate	2-4 Jahre	5-6 Jahre	7-8 Jahre	9-14 Jahre	15-16 Jahre	17 Jahre	ab 18 Jahren	ab 60 Jahren		
	U4			U5	U6		U7			U7a/8	U9	U10	U11/J1	J2						
Rotaviren	G1 ^a		G2	(G3)																
Tetanus ^b	G1		G2							G3 ^c								A ^e		
Diphtherie ^b	G1		G2							G3 ^c		A1		A2		A ^e				
Keuchhusten ^b (Pertussis)	G1		G2							G3 ^c		A1		A2		A ^e				
HiB ^b (Haemophilus influenzae Typ b)	G1		G2							G3 ^c								A3 ^e		
Kinderlähmung ^b (Poliomyelitis)	G1		G2							G3 ^c		A1								
Hepatitis B ^b	G1		G2							G3 ^c										
Pneumokokken ^b	G1		G2							G3 ^c								S ^g		
Meningokokken B ^j	G1		G2							G3 ^c										
Meningokokken C							G1													
Masern						G1					G2							S ^f		
Mumps						G1					G2									
Röteln						G1					G2									
Windpocken (Varizellen)						G1					G2									
HPV (Humane Papillomviren)											G1 ^d		G2 ^d							
Gürtelrose (Herpes zoster)																	G1 ^h		G2 ^h	
Grippe (Influenza)																	S ^k			
COVID-19																	G1 ⁱ , G2 ⁱ , G3 ⁱ		S ^k	

G Grundimmunisierung (in bis zu 3 Teilimpfungen G1 – G3)

A Auffrischungsimpfung

S Standardimpfung

Nachholimpfzeitraum für Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. für Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

^a Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen

^b Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen. Säuglinge (inkl. Frühgeborene) werden mit PCV13 oder PCV15 geimpft

^c Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate

^d Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten ist zwischen 1. und 2. Dosis eine 3. Dosis erforderlich

^e Td-Auffrischungsimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung einmalig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung

^f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit

^g Impfung mit PCV20

^h Zweimalige Impfung mit dem adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten

ⁱ Impfung bis die Anzahl der für die Basisimmunität erforderlichen ≥ 3 SARS-CoV-2-Antigenkontakte (davon mindestens 1 Impfung) erreicht ist. Mindestimpfabstand zwischen G1 und G2 ≥ 4 bis vorzugsweise 12 Wochen, und zwischen G2 und G3 ≥ 6 Monate

^j Gemäß Fachinformation besteht die Impfserie im Alter von 2 – 23 Monaten aus 3 Impfstoffdosen, ab dem Alter von 24 Monaten aus 2 Impfstoffdosen

^k Jährliche Impfung im Herbst

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden